


Tulnukliigid suudavad laevade ballastvee mahutites läbida suuri vahemaid.

Oluline on ennetada uute võõrliikide saabumist. Parimaks mooduseks on laevade ballastvee töötlemine enne selle merre pumpamist.

Võõrliigid levivad meretranspordiga



NAFTATERMINALIST
VÄLJUDES



Kui tanker ei vea naftat, täidetakse laeva stabiliseerimiseks selle ballastvee mahutid mereveega. Nafta tankimisel pumbatakse ballastvesi koos selles olevate organismidega merre.



NAFTATERMINALI
SAABUDES



MAGEVEE
HÜDRALAADSED

Mõjutavad elektrijaamade tööd, ummistades nende jahutussüsteeme.



KARBILINE
MYTILOPIS LEUCOPHAEATA

Ummistab veevõtu torustikke. Konkureerib kohalike liikidega toidu ja elupaiga pärast.



KREVELLASED
PALAEMONETES SP

Saabunud ballastveega Mustast ja Kaspia merest. Konkureerib kohalike krevettidega.



ANGERJA PARASIIDID

Levisid sissetoodud elusate angerjatega Jaapanist Saksamaale. Üheks Euroopa angerja populatsiooni kahanemise põhjuseks.



SYKE